



## Değerli Meslektaşlarım

*Akciğer Arşivimizin bu sayısında KOAH hastalarının sigaraya devam etmesi ya da sigarayı bırakması durumunda, klinik özelliklerinde nasıl bir seyir olduğunu araştıran orijinal bir araştırma ve üç ilginç olgu sunumunu sizlerle paylaşıyoruz.*

*Orijinal araştırmada; sigara içen ve sigara içmeyi bırakmış olan KOAH hastalarının klinik özellikleri araştırılmış ve farklılıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmaya alınan 447 KOAH hastasından, 111'inin (%24,83) sigara içmeye devam ettiği saptanan araştırmada, sigarayı bırakanların, sigara içenlerden önemli ölçüde daha yaşlı olmasına rağmen, sigara içmeye devam eden KOAH hastalarında acil servis ziyaretlerinin ve hastane yatışlarının sayısının daha yüksek olduğu gösterilmiştir.*

*İlk olgu; Pulmoner tromboemboli tablosuyla izlenen ve etyolojik ajan araştırılan bir hastada, Nefrotik sendromun alt tiplerinden birisi olan minimal değişim hastalığı (MDH) tanısı konmuş, nadir görülmesi ve ilk prezantasyon kliniğinin pulmoner tromboemboli olması nedeniyle ilginç bulunarak sunulmuştur.*

*İkinci olgu; Pandemi döneminde dış teknisyeni pnömokonyozu tanısıyla takip edilen ve radyolojik şüphe üzerine yapılan incelemelerde ayrıca tüberküloz tanısı konulan bir olgu sunulmuş, Dış teknisyenlerinde, dış teknisyeni pnömokonyozunun erken tanısı için periyodik göğüs röntgeni ve solunum fonksiyon testleri yapılmasının önemi vurgulanmıştır.*

*Son olgu; Sırtta ağrı ve sırtta yabancı cisim şüphesiyle başvuran 34 yaşındaki bir erkek hastanın, lateral sol skapula bölgesinde radyolojik görüntüleme yöntemlerinde tespit edilen yabancı cismin, derin sedasyonla çıkarıldığında, bir dikiş iğnesi olduğu görülmüş ve nadiren görülen göğüs duvarındaki dikiş iğnesinin, hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabileceği vurgulanmıştır.*

*Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.*

*Saygılarımla*

**Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ**

*Editör*