

Tanınız Nedir?

Derya KARAKAŞ*, Ayşe SERDAROĞLU**

* Dr.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,

** Doç.Dr.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, ANKARA

5 aylık erkek çocuk bayılma, dalgınlık, kusma ve uykuya meyil yakınmaları ile çocuk acil polikliniğine getirildi. Öyküsünden hastanın birgün önce huzursuzluğunun başladığı, iştahsız olduğu, dalgınlığı, uyarı verildiğinde gözlerini açıp tekrar uykuya daldığı, üç kez yediklerini içeren kusmalarının olduğu, ateşinin ölçülmediği, düşme, çarpma veya ilaç alımı öyküsünün bulunmadığı öğrenildi.

Öz ve soygeçmişinde özellik yoktu.

Fizik ve nörolojik incelemesinde ateş: 36.8°C boy: 60 cm (%5-10), vücut ağırlığı: 7000 gr (%25), baş çevresi: 43 cm (%25-50), Nb: 134/dk, sol. sayısı: 24/dk, ön fontanel: 0.5x0.5 cm çapında mobil bombelikte idi. Hasta uykuya meyilli olup, meninks irritasyon bulguları yoktu.

Karaciğer ve dalak ele gelmiyordu. Sağ epigastriumda 3x3 cm çapında yumuşak kıvamda kitle palpe edildi. Rektal tuşede kanla karışık gaita olduğu gözlemlendi.

Laboratuvar incelemesinde:

Kan sayımı: Hb: 9.3 gr/dl, beyaz küre: 16.700/mm³, MCV: 69.2 fl., periferik yaymasında: %60 parçalı, %40 lenfosit, anizositoz, hipokromasi uzadı. Trombositler kümeli idi.

Biyokimya: Kan şekeri: 162 mg/dl, Na: 135 mEq/lt, K: 4.2 mEq/lt olarak bulundu.

Abdominal ultrasonografi: Sol üst kadranda 3x4 cm çaplı, ortası hiperekojen, çevresi hipoekoik kitle izlenmiştir (Şekil 1,2).



Şekil 1.



Şekil 2.

Geliş Tarihi: 12.06.1997

Yazışma Adresi: Dr.Derya KARAKAŞ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, ANKARA